



Butiphorce 1065

Sector avícola

Es una fuente rica de ácido bórico inoloro y de liberación específica con capacidad de estimular una pared intestinal saludable, una digestión óptima.

Por su influencia positiva en el epitelio de la pared intestinal los alimentos se pueden digerir mejor y el animal dispone de más nutrientes, lo que conduce a un mayor rendimiento en aves de corral. La liberación de ácido bórico en alta concentración permite el manejo de dosis bajas y reducir el costo de tratamiento.

Los ácidos bóricos de liberación lenta como **Butiphorce 1065**, mejoran el rendimiento de las siguientes formas:

Composición

Butiphorce 1065 está compuesto de triglicéridos de ácido bórico.

Dosis

Pollos de engorde:

Inicio: 0.50 - 1.00 kg / tonelada

Engorde: 0,25 - 0,75 kg / tonelada

Finalizador: 0,25 - 0,50 kg / tonelada

Gallinas ponedoras

Fase de postura I: 0,25-0,50 kg / tonelada

Fase de postura II: 0,25-0,50 kg / tonelada

Fase de postura III: 0,25-1,00 kg / tonelada

Pavos:

Pre Inicio: 1,00 - 2.00 kg / tonelada

Engorde: 0,50 - 1,00 kg / tonelada

Beneficios Claves de Butiphorce

- Mayores tasas de crecimiento.
- Mejor relación de conversión alimenticia (FCR).
- Mejor maduración de las células de la pared intestinal, su integridad y uniones estrechas (Tight Junction).
- Liberación del ácido bórico en todo el tracto intestinal.
- Fácil de usar y sin olor.

Proporciones y Apariencia física

Embalaje: Saco de papel de 25 kg

Un alto rendimiento de las aves de corral requiere un intestino sano que sea capaz de digerir y utilizar el pienso de forma óptima.

Se sabe que las toxinas y las bacterias patógenas, como la *Salmonella* y la *Escherichia coli*, pueden adherirse a la pared intestinal y desafiar continuamente el desarrollo y la integridad de la pared intestinal.

Butiphorce es una herramienta clave para estimular la salud intestinal, el rendimiento y la eficiencia productiva.






Butiphorce 1065

Sector avícola


Casos de estudio - Aplicación de Butiphorce

1. Altura de las velocidades de pollos de engordes estresados con lipoproteína con/sin fuentes de ácido butírico




3. Gallinas ponedoras con butirina

Prueba de rendimiento (54-60 semanas de edad) 750g/ton.




2. Rendimiento de pollos de engorde con butirina



4. Gallinas ponedoras con butirina

Prueba de rendimiento (54-60 semanas de edad) 750g/ton.



Tributirina y digestibilidad

Pollos de engorde con 23 días de edad (0,5kg/ton)

	Control	Tributirina	+mas/-menos
DM	53,1	54,5	+
OM	59,7	61,2	+
Nitrógeno	76,6	77,0	+
Lisina	81,2	82,0	+
Metionina	89,5	89,9	+
Cisteína	70,0	70,8	+
Treonina	73,4	74,7	+

